

2022年11月追補

内服療法（全身療法）

種類	一般名	主な商品名・含量	用法/使用量制限	備考（注意すべき 主な副作用等）
TYK2 阻害薬	デュークラバシチ ニブ ※2022年11月発 売	ソーティクツ®錠 6mg	通常、成人にはデ ュークラバシチニ ブとして1回6mg を1日1回経口投 与する。	・禁忌：重篤な感 染症、活動性結核 ・生物学的製剤と の併用不可 ・上気道乾癬、単 純ヘルペス、帯状 疱疹、口腔潰瘍、ざ 瘡様皮疹、毛包炎

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬におけ る国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL- 17A/IL-17F モノ クローナル抗体 【標的】 IL-17A/F ※2021年4月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シ リンジ 160mg/1.0mL オ ートインジェクタ ー	皮下注射 1回320mgを初回 -16週までは4週 間隔、以降は8週 間隔で投与する。 患者の状態に応じ て16週以降も4 週間隔で投与でき る。	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 ※乾癬性関節炎に 対する治験を実施 中
受容体抑制製剤	スペソリマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL- 36 レセプターモ ノクローナル抗体 【標的】 IL-36 受容 体 ※2022年11月発 馬	スペビゴ® 点 滴 静 注 450mg/1 バイア ル (7.5mL)	点滴静注 1回900mg なお、急性症状が 持続する場合に は、初回投与の1 週間後に900mg を追加投与するこ とができる。	膿疱性乾癬におけ る急性症状の改善

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」

2022年12月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	セクキヌマブ 【構造】 ヒト型モノクロー ナル抗体 【標的】 IL-17A	コセンティクス® 150mg/1mL シリ ンジ* 150mg/1mL ペン 75mg/1mL シリン ジ** 300mg/1mL ペン *** *2021年5月販売 中止 **2022年2月発売 ***2022年11月発 売	皮下注射 0, 1, 2, 3, 4 週間隔 以後 4 週間隔 1回 300mg（体重 60kg 以下は 150mg に減量可） 自己注射（○） 6歳以上の小児* 体重 50kg 未満 1回 75mg 体重 50kg 以上 1回 150mg（状態 に応じて 300mg 投与可） *2021年9月適応 追加	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」

2023 年 5 月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL- 17A/IL-17F モノ クローナル抗体 【標的】IL-17A/F ※2021 年 4 月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シ リンジ 160mg/1.0mL オ ートインジェクタ ー	皮下注射 1 回 320mg を初回 -16 週までは 4 週 間隔、以降は 8 週 間隔で投与する。 患者の状態に応じ て 16 週以降も 4 週間隔で投与でき る。 ※4 週間隔で投与 する場合のみ自己 投与が可能	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 ※乾癬性関節炎に 対する効能・効果 を申請中