

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」

2024年8月追補

外用療法（局所療法）

種類	一般名	主な商品名・含量 [剤型]	用法 / 使用制限	備考（注意すべき 主な副作用等）
芳香族炭化水素受 容体調節薬	タピナロフ	ブイタマー <sup>®</sup> クリ ーム 1%	1回 / 日 成人のみ	適用部位毛包炎 (17.0%) 接触皮膚炎 (8.9%) 適用部位ざ瘡 (7.6%) 頭痛 (7.5%) 皮膚感染部位を避 けて使用すること。 ※2024年10月29 日発売予定

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制製剤	<p>ビメキズマブ</p> <p>【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17A/IL-17F モノクローナル抗体</p> <p>【標的】IL-17A/F</p> <p>※2021 年 4 月発売</p>	<p>ビンゼレックス®</p> <p>160mg/1.0mL シリンジ</p> <p>160mg/1.0mL オートインジェクター</p>	<p>皮下注射</p> <p>尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症</p> <p>1 回 320mg を初回-16 週までは 4 週間隔、以降は 8 週間隔で投与する。患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で投与できる。</p> <p>乾癬性関節炎 通常、成人にはビメキズマブ（遺伝子組換え）として、1 回 160mg を 4 週間隔で皮下注射する。</p>	<p>尋常性乾癬</p> <p>膿疱性乾癬</p> <p>乾癬性紅皮症</p> <p>乾癬性関節炎</p>

2023 年 5 月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17A/IL-17F モノクローナル抗体 【標的】IL-17A/F ※2021 年 4 月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シリンジ 160mg/1.0mL オートインジェクター	皮下注射 1 回 320mg を初回-16 週までは 4 週間隔、以降は 8 週間隔で投与する。患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で投与できる。 ※4 週間隔で投与する場合のみ自己投与が可能	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 ※乾癬性関節炎に対する効能・効果を申請中

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」

2022年12月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	セクキヌマブ 【構造】 ヒト型モノクロー ナル抗体 【標的】 IL-17A	コセンティクス® <del>150mg/1mL シリ</del> <del>ンジ*</del> 150mg/1mL ペン 75mg/1mL シリン ジ** 300mg/1mL ペン *** *2021年5月販売 中止 **2022年2月発売 ***2022年11月発 売	皮下注射 0, 1, 2, 3, 4 週間隔 以後 4 週間隔 1回 300mg（体重 60kg 以下は 150mg に減量可） 自己注射（○） 6歳以上の小児* 体重 50kg 未満 1回 75mg 体重 50kg 以上 1回 150mg（状態 に応じて 300mg 投与可） *2021年9月適応 追加	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬

2022年11月追補

内服療法（全身療法）

種類	一般名	主な商品名・含量	用法/使用量制限	備考（注意すべき 主な副作用等）
TYK2 阻害薬	デュークラバシチ ニブ  ※2022年11月発 売	ソーティクツ®錠 6mg	通常、成人にはデ ュークラバシチニ ブとして1回6mg を1日1回経口投 与する。	・禁忌：重篤な感 染症、活動性結核 ・生物学的製剤と の併用不可 ・上気道乾癬、単 純ヘルペス、帯状 疱疹、口腔潰瘍、ざ 瘡様皮疹、毛包炎

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬におけ る国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ <b>【構造】</b> ヒト化抗ヒト IL- 17A/IL-17F モノ クローナル抗体 <b>【標的】</b> IL-17A/F  ※2021年4月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シ リンジ 160mg/1.0mL オ ートインジェクタ ー	皮下注射 1回320mgを初回 -16週までは4週 間隔、以降は8週 間隔で投与する。 患者の状態に応じ て16週以降も4 週間隔で投与でき る。	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症  ※乾癬性関節炎に 対する治験を実施 中
受容体抑制製剤	スペソリマブ <b>【構造】</b> ヒト化抗ヒト IL- 36 レセプターモ ノクローナル抗体 <b>【標的】</b> IL-36 受容 体  ※2022年11月発 馬	スペビゴ® 点 滴 静 注 450mg/1 バイア ル (7.5mL)	点滴静注 1回900mg なお、急性症状が 持続する場合に は、初回投与の1 週間後に900mg を追加投与するこ とができる。	膿疱性乾癬におけ る急性症状の改善