

2025 年 6 月追補

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
受容体抑制製剤	プロダルマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17 受容体 A モノクローナル抗体 【標的】IL-17 受容体 A	ルミセフ® 210mg/1.5mL シリンジ 210mg/1.5mL ペン	皮下注射 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 皮下注射 0, 1, 2 週間隔以降、2 週間に 1 回 1 回 210mg	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 乾癬性関節炎

2025 年 2 月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17A/IL-17F モノクローナル抗体 【標的】IL-17A/F ※2021 年 4 月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シリンジ 160mg/1.0mL オートインジェクター 320mg/2.0nL オートインジェクター	皮下注射 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 1 回 320mg を初回-16 週までは 4 週間隔、以降は 8 週間隔で投与する。 患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で投与できる。 乾癬性関節炎 通常、成人にはビメキズマブ（遺伝子組換え）として、1 回 160mg を 4 週間隔で皮下注射する。	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 乾癬性関節炎

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」
2024 年 8 月追補

外用療法（局所療法）

種類	一般名	主な商品名・含量 [剤型]	用法 / 使用制限	備考（注意すべき 主な副作用等）
芳香族炭化水素受 容体調節薬	タピナロフ	ブイタマー®クリ ーム 1%	1 回 / 日 成人のみ	適用部位毛包炎 （17.0%） 接 触 皮 膚 炎 （8.9%） 適用部位ざ瘡 （7.6%） 頭痛（7.5%） 皮膚感染部位を避 けて使用すること。 ※2024 年 10 月 29 日発売予定

2023 年 12 月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17A/IL-17F モノクローナル抗体 【標的】IL-17A/F ※2021 年 4 月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シリンジ 160mg/1.0mL オートインジェクター	皮下注射 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 1 回 320mg を初回-16 週までは 4 週間隔、以降は 8 週間隔で投与する。 患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で投与できる。 乾癬性関節炎 通常、成人にはビメキズマブ（遺伝子組換え）として、1 回 160mg を 4 週間隔で皮下注射する。	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 乾癬性関節炎

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」

2023 年 5 月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17A/IL-17F モノクローナル抗体 【標的】IL-17A/F ※2021 年 4 月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シリンジ 160mg/1.0mL オートインジェクター	皮下注射 1 回 320mg を初回-16 週までは 4 週間隔、以降は 8 週間隔で投与する。患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で投与できる。 ※4 週間隔で投与する場合のみ自己投与が可能	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 ※乾癬性関節炎に対する効能・効果を申請中

みんなで治そう乾癬ハンドブック別冊「主な乾癬治療薬 2021」

2022 年 12 月追補

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制 製剤	セクキヌマブ 【構造】 ヒト型モノクロー ナル抗体 【標的】 IL-17A	コセンティクス® 150mg/1mL シリンジ* ペンジ* 150mg/1mL ペン 75mg/1mL シリンジ** 300mg/1mL ペン*** *** *2021 年 5 月販売 中止 **2022 年 2 月発売 ***2022 年 11 月発売	皮下注射 0, 1, 2, 3, 4 週間隔 以後 4 週間隔 1 回 300mg（体重 60kg 以下は 150mg に減量可） 自己注射（○） 6 歳以上の小児* 体重 50kg 未満 1 回 75mg 体重 50kg 以上 1 回 150mg（状態 に応じて 300mg 投与可） *2021 年 9 月適応 追加	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬

2022 年 11 月追補

内服療法（全身療法）

種類	一般名	主な商品名・含量	用法/使用量制限	備考（注意すべき 主な副作用等）
TYK2 阻害薬	デュークラバシチ ニブ ※2022 年 11 月発 売	ソーティクツ®錠 6mg	通常、成人にはデュークラバシチニブとして 1 回 6mg を 1 日 1 回経口投与する。	・禁忌：重篤な感染症、活動性結核 ・生物学的製剤との併用不可 ・上気道乾癬、単純ヘルペス、帯状疱疹、口腔潰瘍、ざ瘡様皮疹、毛包炎

生物学的製剤（全身療法）

種類	一般名・構造・標的	主な商品名・規格	用法/使用量制限	備考（乾癬における国内承認状況）
サイトカイン抑制製剤	ビメキズマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-17A/IL-17F モノクローナル抗体 【標的】IL-17A/F ※2021 年 4 月発売	ビンゼレックス® 160mg/1.0mL シリンジ 160mg/1.0mL オートインジェクター	皮下注射 1 回 320mg を初回 -16 週までは 4 週間隔、以降は 8 週間隔で投与する。患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で投与できる。	尋常性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 ※乾癬性関節炎に対する治験を実施中
受容体抑制製剤	スペソリマブ 【構造】 ヒト化抗ヒト IL-36 レセプターモノクローナル抗体 【標的】IL-36 受容体 ※2022 年 11 月発売	スペビゴ® 点 滴 静 注 450mg/1 バイアル (7.5mL)	点滴静注 1 回 900mg なお、急性症状が持続する場合には、初回投与の 1 週間後に 900mg を追加投与することができる。	膿疱性乾癬における急性症状の改善